


***Фото  
медпункта***







**Экстренная помощь при анафилактическом шоке.**

1. Обеспечить больному доступ свежего воздуха и полный покой. Дыхательные пути очистить 0,5-0,5% раствором Адrenalina и место инъекции обработать 0,5% раствором йода и приложить к этому месту лед.
2. Для подавления аллергической реакции и уменьшения проницаемости сосудов в глаза проложить муравьиный уксусный раствор. Промывать глаза 2% раствором. С той же целью ввести антигистаминные препараты: раствор Димедрол 1% - 2-3мл, раствор Супрастин 2% - 2мл, раствор Псило-фен перорально. Антигистаминные препараты вводятся внутривенно в сочетании с раствором кальция хлорида 10% - 5мл. Если имеются перкуссионные мероприятия эффект не ясен и больший эффект в сочетании с раствором. То следует сделать инъекцию для устранения анафилактического шока. Не следует делать инъекции для устранения анафилактического шока. Не следует делать инъекции для устранения анафилактического шока. Не следует делать инъекции для устранения анафилактического шока.
3. При выраженной сердечной недостаточности ввести внутривенно раствор Строфандина 0,05% - 0,5мл или раствор Кордилона 0,05% - 0,5мл или атропиновый раствор 1% - 0,5мл.
4. При наличии брадикардии ввести внутривенно раствор Эуфиллина 2,4% - 10мл. При брадикардии на фоне введения кордилона эффект не ясен. При брадикардии раствор Эуфиллин 2,4% - 10мл.
5. Больной с анафилактическим шоком выложить горизонтально и респираторные средства.



помощи при  
анафилактическом  
шоке

табл и

Пиретриновый  
препарат для  
обработки помещений

Эуфиллин



